

Cognitieve stoornissen bij patiënten met neuropsychiatrische symptomen: Een vergelijking tussen de gedrags-variant Frontotemporale dementie en primaire psychiatrische stoornissen.

In deze studie hebben we de neuropsychologische profielen van de gedrags-variant van Frontotemporale dementie (gvFTD) en de meest voorkomende psychiatrische stoornissen (depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie) met elkaar vergeleken. We hebben dat gedaan omdat de symptomen van die ziektebeelden erg op elkaar lijken en diagnoses daarom vaak niet goed worden gesteld. De aanwezigheid van cognitieve stoornissen is een belangrijk klinische criterium voor een *mogelijke* gvFTD diagnose. We verwachten daarbij met name stoornissen op het gebied van het executive functioneren met in verhouding gespaarde functies van het geheugen en visueel-ruimtelijke functies.

Wij vonden dat alle patiëntengroepen een significant lagere score hadden op alle cognitieve testen in vergelijking met gezonde controles. Daarnaast vertoonden gvFTD patiënten minder ernstige executieve functie stoornissen en verbale geheugen problemen dan de drie psychiatrische patiëntengroepen. Echter gvFTD patiënten hadden meer moeite met de taaltesten. De aandachtfunctie en het werkgeheugen waren het meest aangetast in patiënten met een depressie. Onze studie geeft aan dat de cognitieve stoornissen weinig duidelijkheid bieden bij het onderscheid maken tussen gvFTD en een primair psychiatrische diagnose (depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie).